**ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ANTI-HVC В ГРУППАХ НЕПРИВИТЫХ
И ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА МАРКЕРЫ ВГВ,
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ**

Магомедова Н. А. ^{1,2},

Костинов М. П. ^{1,3},

Храпунова И. А. ^{1,4},

Линок А. В. ^{1,3},

Локтионова М. Н. ^{1,4},

Полищук В. Б. ³,

Ястребова Н. Е. ³,

Поддубиков А. А. ¹

¹ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения, Москва, Россия.

² ФГБОУ ВО ДГМУ Минздрава России, Махачкала, Российская Федерация.

³ Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова», Москва, Россия.

⁴ Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, Российская Федерация.

**THE PREVALENCE OF ANTI-HBC ANTIBODIES IN GROUPS OF
MEDICAL WORKERS WHO WERE EITHER UNVACCINATED OR
VACCINATED AGAINST HEPATITIS B WITHOUT PRIOR TESTING
FOR HBV MARKERS**

Magomedova N. A. ^{a, b},

Kostinov M. P. ^{a, c},

Khrapunova I. A. ^{a, d},

Linok A. V. ^{a, c},

Loktionova M. N. ^{a, d},

Polishchuk V. B. ^c,

Yastrebova N. E. ^c,

Poddubikov A. A. ^a

^a I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation.

^b Dagestan State Medical University, Ministry of Health of Russia, Makhachkala, Russian Federation.

^c Federal State Budgetary Scientific Institution I.I. Mechnikov Research Institute of Vaccines and Serums, Moscow, Russian Federation.

^d Central Research Institute of Epidemiology, Moscow, Russian Federation.

Резюме

У медицинских работников сохраняется повышенный риск инфицирования вирусным гепатитом В (ВГВ), который чаще выявляется тестированием на HBsAg. Anti-HBc также считают надежным маркером ВГВ и рекомендуют в качестве «эпидемиологического» при проведении скрининга на наличие в прошлом контакта организма с этим вирусом, однако реже применяют на практике.

Целью исследования являлось определение частоты встречаемости anti-HBc в группах вакцинированных против ВГВ и непривитых медицинских работников.

Исследуемая выборка представлена 1 597 образцами сывороток крови медицинских работников, подвергшихся первичной трех-дозовой вакцинации против гепатита В и 46 непривитых сотрудников пяти медицинских организаций стационарного и амбулаторно-поликлинического типа в возрасте 18 лет и старше. Образцы сывороток крови исследовали на наличие anti-HBs и anti-HBc методом ИФА.

Сравнительный анализ на наличие anti-HBc в крови выявил, что при проведенной первичной вакцинации против гепатита В, сероконверсия anti-HBc в когорте привитых, составила в 35,4% случаев, в когорте непривитых – 76,1%, что в 2 раза больше по сравнению с привитыми ($p < 0,001$). Результаты сероконверсии в группе привитых указывают на то, что вакцинация была проведена на фоне инфицирования ВГВ или течения латентной формы гепатита В. Отсутствие сероконверсии отмечено у 23,9% непривитых сотрудников и у 64,6% вакцинированных ($p < 0,001$). Соответственно, у вакцинированных этот показатель в 2,7 раза выше по сравнению с когортой непривитых. Не выявили зависимости наличия anti-HBc от уровня гуморального иммунитета. Удельный вес anti-HBc+ в группах с anti-HBs < 10 мМЕ/мл и anti-HBs > 10 мМЕ/мл практически одинаков в обеих группах – 23,8% и 23,7% соответственно. Распределение anti-HBc по срокам после

проведенной иммунизации в трех группах: 1 (3 месяца – 5 лет); вторая (6–15 лет) и третья (16–23 года) в когортах с наличием и отсутствием суммарных антител к ВГВ показал наименьшее число (5,4% и 3,4%) лиц с anti-HBс среди привитых первой группы, что косвенно свидетельствует о роли вакцинации в профилактике инфицирования вирусом в ближайшие 5 лет. Результаты исследования указывают на необходимость предварительного тестирования на наличие anti-HBс при проведении вакцинации против ВГВ с целью выявления частоты инфицирования и определения контингентов, подлежащих углубленному обследованию на ВГВ

Ключевые слова: Медицинские работники, вакцинация против гепатита В, поствакцинальные anti-HBs, анти-HBс, латентная форма гепатита В, поствакцинальный иммунитет.

Abstract

An increased risk of infection with hepatitis B virus (HBV) more often detected by testing for HBsAg remains in healthcare professionals. Hiv-HBc is also considered a reliable HBV marker and is recommended as an "epidemiological" screening for former HBV exposure, but is less commonly used in practice. The aim of the study was to determine the incidence of anti-HBc in groups of unvaccinated and HBV-vaccinated medical workers. The study sample consisted of 1,597 blood serum samples collected from medical workers who underwent primary three-dose hepatitis B vaccination and 46 unvaccinated employees aged 18 years and older from five inpatient and outpatient medical organizations. Blood serum samples were tested for anti-HBs and anti-HBc antibodies using enzyme-linked immunosorbent assay. A comparative analysis for the presence of blood anti-HBc revealed that during the primary hepatitis B vaccination, anti-HBc seroconversion in the vaccinated and unvaccinated cohort was 35.4% and 76.1%, respectively, which is twice as more than in the vaccinated ($p < 0.001$) subjects. The results of seroconversion in the vaccinated group indicate that the vaccination was carried out upon HBV infection or latent hepatitis B. The lack of seroconversion was noted in 23.9% and in 64.6% of unvaccinated and of vaccinated employees, respectively ($p < 0.001$). Accordingly, this indicator is 2.7-fold higher in the vaccinated vs. unvaccinated cohort. The presence of anti-HBc was not found to depend on the level of humoral immunity. The specific gravity of anti-HBc+ in the groups with anti-HBs < 10 mIU/ml and anti-HBs > 10 mIU/ml is almost the same in both groups – 23.8% and 23.7%, respectively. Distribution of anti-HBc post-immunization was as follows: group 1 (3 months – 5 years); group 2 (6–15 years old) and group 3 (16–23 years old) with and without total anti-HBV antibodies showed the lowest number (5.4% and 3.4%) of individuals with anti-HBs among vaccinated subjects in group 1, which indirectly evidences about the effect of vaccination in preventing infection with the virus in the next 5 years. The study results point at a need for pre-vaccination

anti-HBc testing to determine prevalence of infection and identify groups requiring further in-depth HBV testing.

Keywords: Medical workers, Hepatitis B vaccination, post-vaccination anti-HBs, Anti-HBc, latent form of hepatitis B, post-vaccination immunity.

1 **1 Введение**

2 У медицинских работников сохраняется повышенный риск
 3 инфицирования вирусным гепатитом В (ВГВ), в связи с проведением
 4 парентеральных манипуляций, частым контактом с кровью пациентов,
 5 которая является основным фактором передачи инфекции [11, 12, 13].
 6 Распространение вируса предупреждают путем вакцинации взрослого
 7 населения, включая работников здравоохранения [5, 24]. В Российской
 8 Федерации вакцинация против гепатита В включена в рамках Национального
 9 календаря профилактических прививок с 2000 г. ~~Вакцинацию проводят детям~~
 10 ~~и взрослым в возрасте до 55 лет, ранее не привитых против этой инфекции~~ [8].
 11 Охват прививками населения в возрасте 18-35 лет в 2023 г. составил 97,79%, в
 12 возрасте 36-59 лет – 92,06%, а старше 60 лет – 44,20% [7]. С каждым годом
 13 продолжает увеличиваться уровень охвата вакцинацией взрослого населения,
 14 что позволило снизить заболеваемость острым гепатитом В (ОГВ) в 2023 году
 15 до 0,33 на 100 тыс. населения. Вместе с тем заболеваемость хроническим
 16 гепатитом В (ХГВ) в Российской Федерации растет, и на конец 2023 года
 17 составляет 8,45‰, что в два раза превышает показатель 2020 года
 18 (4,36‰) [7]. В связи с этим особого внимания заслуживают маркеры ВГВ,
 19 позволяющие, помимо anti-HBs (антитела к поверхностному белку вируса),
 20 характеризующих степень иммунной защиты от ВГВ, определять anti-HBс
 21 (антитела к ядерному белку вируса), наличие которых является следствием
 22 перенесенного ГВ и возможным признаком латентной формы гепатита В
 23 (ЛГВ) [1, 9]. Однако в программах скрининга на ВГВ часто тестируются
 24 только HBsAg и анти-HBs, пропуская тех лиц, у которых анти-HBс является
 25 единственным обнаруживаемым маркером. Вместе с тем изолированный анти-
 26 HBс может представлять собой признак хронической инфекции, при которой
 27 HBsAg не обнаруживается серологически.

28 Anti-HBс считают самым надежным серологическим маркером ВГВ и
 29 рекомендуют в качестве «эпидемиологического» при проведении скрининга

30 на наличие в прошлом контакта организма с этим вирусом [20, 23]. На
31 сегодняшний день не существует единого общепринятого термина для
32 обозначения состояния, возникающего после разрешения острого или
33 хронического гепатита В и характеризующегося особым набором
34 серологических маркеров вируса: отсутствием HBsAg и наличием anti-HBс
35 класса IgG (в сочетании с anti-HBs или без них). В литературе имеются данные
36 об увеличении этого показателя с возрастом и достижения максимума в
37 пожилом возрасте (60-70 лет) [23]. Вместе с тем отсутствуют результаты
38 исследования, посвященные анализу зависимости anti-HBс от степени
39 напряженности гуморального иммунитета против гепатита В у медицинских
40 работников.

41 **Цель исследования:** определить частоту встречаемости anti-HBс в
42 группах вакцинированных и непривитых, медицинских работников.

43 2 Материалы и методы

44 Общая выборка представлена 1 643 медицинскими работниками пяти
45 медицинских организаций стационарного и амбулаторно-поликлинического
46 типа. При этом вакцинированные сотрудники составили 1 597 (97,2%) человек
47 и непривитые (отказавшиеся по разным причинам от иммунизации) 46 (2,8%)
48 человек. Субъекты включены в исследование после получения письменного
49 согласия.

50 Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГАОУ ВО
51 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М.
52 Сеченова Министерство здравоохранения Российской Федерации
53 («Сеченовский Университет»), протокол № 13-23 от 20.07.23.

54 Критерии *включения* в исследование: работники медицинских
55 организаций с 18 лет и старше с документальным подтверждением наличия
56 трехдозовой первичной вакцинации против гепатита В в разные временные
57 промежутки (от 3 месяцев до 23 лет); давшие согласие на обработку
58 результатов исследований; а также лица, непривитые по различным причинам.

59 Критерии *невключения* в исследование: документально
60 подтвержденный ВГВ; наличие острых инфекционных или обострение
61 хронических заболеваний на момент исследования; иммуносупрессивная
62 терапия; онкологические заболевания; получение иммуноглобулина за
63 последние 3 месяца.

64 Образцы сывороток крови исследовали на наличие anti-HBs и анти-HBс
65 методом ИФА. Работа выполнена с использованием сертифицированного
66 оборудования центра коллективного пользования ФГБНУ «НИИ вакцин и
67 сывороток им. И.И. Мечникова».

68 Для статистического анализа результатов исследования использованы
69 пакеты Microsoft Office Excel 2010 и программы Prism9 (GraphPad, США). Для
70 сравнения долей применили критерий хи-квадрат, **доверительные интервалы**
71 **для долей рассчитаны по методу Уилсона** [3, 4].

72 3 Результаты

73 *Сравнительный анализ когорты вакцинированных против ВГВ и*
74 *непривитых по наличию анти-HBс в сыворотке крови.*

75 Из общей выборки вакцинированных против ВГВ и непривитых
76 медицинских работников (1 643) anti-HBс был обнаружен у 601 человека, что
77 составило 36,6% (95%ДИ:34,4-39,0), у 1 042 человек, или 63,4% (95%ДИ:61,2-
78 65,9); anti-HBс не был выявлен ($p < 0,001$ ($\chi^2 = 236,7$, $df = 1$, $RR = 1,73$ (95%ДИ 1,61-
79 1,87))

80 Эти данные свидетельствуют о том, что почти треть работников
81 медицинских организаций (36,6%) переболели ВГВ в прошлом, возможно, в
82 стертой, безжелтушной форме, поскольку клинический диагноз не был
83 выставлен, часть из них может страдать латентной формой гепатита В (ЛГВ).

84 Когорта медицинских работников, вакцинированных против ВГВ,
85 составила 1 597 человек, из которых 1 031 человек, или 64,6%, не имели
86 антитела к ядерному белку ВГВ (anti-HBс-)(1031; 95%ДИ: 62,33- 67,03); 566
87 человек, или 35,4% (566; 95%ДИ: 33,21-37,91), показали сероконверсию (anti-

88 HBс+) ($p < 0,001$, ($\chi^2 = 270,8$, $df = 1$, $RR = 1,82$ (95%ДИ 1,69-1,96)). Структура
89 сероконверсии anti-HBс в когорте вакцинированных и непривитых против
90 ВГВ медицинских работников представлена в Таблице 1

91 В когорте не получавших вакцину против ВГВ, которая составила 46
92 медицинских работников, в крови у 35 человек, или 76,1% (35; 95% ДИ:
93 (67,01- 92,95) был обнаружен anti-HBс. Отрицательные результаты теста
94 показали 11 медицинских работников, или 23,9% (11; 95%ДИ: 15,02- 40,96) от
95 числа непривитых ($p < 0,001$, ($\chi^2 = 25,04$, $df = 1$, $RR = 0,34$ (95%ДИ 0,18-0,54)).

96 Анализируя эти данные таблицы 1 можно отметить, что в когорте
97 вакцинированных против ВГВ доля медицинских работников с наличием
98 антител к ядерному белку более чем в 2 раза (2,1) меньше ($p < 0,001$ ($\chi^2 = 1,84$,
99 $df = 1$, $RR = 0,95$ (95%ДИ 0,93-0,97)), по сравнению с когортой непривитых
100 (35,4% и 76,1% соответственно), а доля с отрицательными показателями (anti-
101 HBс) в 2,7 раза больше ($p < 0,001$ ($\chi^2 = 31,84$, $df = 1$, $RR = 1,05$ (95%ДИ 1,03-1,07))
102 по сравнению с непривитыми (64,6% и 23,9% соответственно). Следовательно,
103 вакцинация против ВГВ, проведенная без исследования медицинских
104 работников на наличие anti-HBс, сопровождалась дальнейшей профилактикой
105 инфицирования сотрудников. Абсолютные данные и эстетические показатели
106 с указанием степени статистической достоверности различий между группами
107 и доверительных интервалов представлены в таблице 1.

108 *Сравнительный анализ когорты привитых по наличию anti-HBс в*
109 *зависимости от напряженности поствакцинального гуморального*
110 *иммунитета к ВГВ*

111 Распределение anti-HBс у привитых медицинских работников с
112 наличием и отсутствием протективного уровня anti-HBс представлено в
113 таблице 2.

114 Анализ серологических тестов, определяющих напряженность
115 иммунитета по уровню anti-HBс (антитела к поверхностному антигену) в
116 сыворотке крови в когорте вакцинированных лиц показал, что в 781 образце

117 отмечалось отсутствие протективного уровня (anti-HBs <10 мМЕ/мл), что
118 составило 48,9% (781; 95% ДИ: 46,57-51,48), т. е. практически половина от
119 числа вакцинированных не имела защитных значений anti-HBs ВГВ. При этом
120 у 186 человек отмечен положительный результат на anti-HBс, что составляет
121 23,8% (186; 95%ДИ: 21,06 - 27,06) от данной исследуемой когорты. В когорте
122 лиц с наличием протективных уровней иммунитета (anti-HBs >10 мМЕ/мл)
123 серопозитивные лица по anti-HBс составили 380 человек, или 46,6% (380;
124 95%ДИ: 43,43- 50,29).

125 *Сравнительный анализ когорты привитых по наличию anti-HBс в*
126 *зависимости от сроков проведения вакцинации против ВГВ*

127 Далее мы проанализировали распределение привитых медицинских
128 работников на наличие anti-HBс в зависимости от сроков, прошедших от
129 первичной вакцинации против ВГВ. Когорты лиц с наличием (>10 мМЕ/мл)
130 и отсутствием (<10 мМЕ/мл) протективных значений anti-HBs по срокам
131 проведения первичной вакцинации были разделены на три группы: первая (3
132 месяца – 5 лет); вторая (6-15 лет) и третья (16-23 года). Распределение
133 привитых лиц с отсутствием протективных уровней anti-HBs (<10 мМЕ/мл) и
134 наличием anti-HBс по годам, прошедшим от первичной вакцинации,
135 представлены в таблице 3.

136 Как следует из таблицы 3 из 781 привитого медицинского работника с
137 отсутствием протективных значений anti-HBs (<10 мМЕ/мл) выделяется
138 группа лиц, вакцинированных против ВГВ от 3 мес. до 5 лет у которых
139 регистрируется наименьшее число (5,4%) лиц с anti-HBс (10; 95%ДИ: 3,01 -
140 9,81). При этом наибольший показатель 62,4% (116; 95%ДИ 56,35- 70,42)
141 серопозитивных лиц отмечается в группе иммунизированных от 6 до 15 лет
142 назад.

143 Распределение вакцинированных против ВГВ медицинских работников
144 с наличием протективных уровней anti-HBs (>10 мМЕ/мл) и наличием anti-

145 HBс по годам, прошедшим от первичной вакцинации, представлено в
146 таблице 4.

147 Как следует из таблицы 4, в когорте вакцинированных с наличием
148 протективного уровня anti-HBs (815 человек), anti-HBс был обнаружен у 380
149 медицинских работников, что составило 46,6% (380; 95% ДИ: 43,43-50,29) от
150 когорты иммунизированных, имеющих защитные уровни anti-HBs . При этом
151 также как и в когорте, не имеющих протективных уровней anti-HBs,
152 наименьший показатель серопозитивных лиц отмечен в группе привитых в
153 первые 5 лет -3,4% (13; 95% ДИ: 2,03-5,82), а наибольший в группе привитых
154 в течение 6-15 лет – 62,9% (239; 95%ДИ: 58,51- 68,28).

155 *Сравнительный анализ когорты непривитых по наличию сероконверсии*
156 *по anti-HBс в зависимости от напряженности гуморального иммунитета к*
157 *ВГВ*

158 Распределение anti-HBс у непривитых против ВГВ медицинских работников
159 представлено в таблице 5

160 Из 46 непривитых медицинских работников сероконверсия по anti-HBs
161 отсутствовала (anti-HBs <10 мМЕ/мл) у 30 или 65,2% человек (30; 95% ДИ:
162 54,82- 83,49) и выявлена (anti-HBs >10 мМЕ/мл) у 16 или 34,8% лиц (16;
163 95%ДИ: 24,49-53,16). При этом у 21 или 70% из 30 серонегативных к ВГВ был
164 обнаружен анти-HBс (21; 95%ДИ:58,32-93,24). Из рассматриваемой когорты
165 непривитых 16 лиц имели протективные уровни anti-HBs, у 14 или 87,5% из
166 них был обнаружен anti-HBс (14; 95% ДИ: 77,1-100,0) и у 2 человек (12,5%)
167 anti-HBс не был выявлен (2; 95%ДИ:4,22- 43,42) (таблица 5).

168 Следовательно, из рассматриваемой когорты непривитых (46 человек)
169 против ВГВ медицинских работников anti-HBс обнаружен у 35 или 76,1% (35;
170 95% ДИ: 67,01-92,95), что свидетельствует об инфицированности или
171 перенесенном в стертой форме гепатите В. У остальных 11 или 23,9% (11; 95%
172 ДИ: 15,02-40,96) anti-HBс не обнаружен, т. е. они не сталкивались с
173 возбудителем.

174 **4 Обсуждение результатов**

175 Следует обратить внимание, что медицинским работникам перед
176 вакцинацией против ВГВ не проводились исследования на наличия anti-HBс,
177 который, по мнению многих исследователей, как в начальной эре массовой
178 вакцинации, так и на последующих этапах внедрения иммунизации среди всех
179 возрастных групп населения, считается надежным серологическим маркером
180 ВГВ и рекомендуется в качестве «эпидемиологического» при проведении
181 скрининга на наличие в прошлом контакта организма с этим вирусом [14, 20].

182 Анализируя полученные данные, можно отметить, что среди
183 медицинских работников, вакцинированных против ВГВ, доля лиц с anti-HBс
184 была в 2 раза меньше по сравнению с непривитыми, что свидетельствует о
185 раннее перенесенном ВГВ возможно в субклинической (безжелтушной) или
186 латентной форме. Обратная картина отмечается в случае отсутствия
187 сероконверсии по anti-HBс: у медицинских работников, вакцинированных
188 против ВГВ, она была в 2,7 раза больше, чем у непривитых, что вполне
189 поддается логике результативности вакцинации. Вакцинированные более
190 защищены не только от острой манифестированной формы ВГВ, но и от
191 стертой, а также хронической, которая может быть выражена латентной
192 формой гепатита В (ЛГВ), впоследствии в ряде случаев приводящей к
193 гепатокарциноме и циррозу печени [2, 6, 10, 17, 20, 22, 23, 24]. О значении
194 скрытой или латентной формы ВГВ сообщает Raimondo G с соавторами. По
195 мнению исследователей персистенция геномов вируса ГВ у лиц с
196 отрицательным поверхностным антигеном ВГВ (HBsAg) называется скрытой
197 инфекцией ВГВ. Скрытый статус ЛГВ в некоторых случаях связан с
198 мутантными вирусами, неопределяемыми с помощью анализов HBsAg, но
199 чаще это связано с сильным подавлением репликации вируса и экспрессии
200 генов. Скрытая инфекция ВГВ имеет глобальное распространение утверждают
201 авторы [21].

202 Об инфицировании вирусом ГВ вакцинированных лиц сообщают Gerlich
203 V.H с соавторами. Исследователи утверждают, что большинство здоровых,
204 анти-НВс-положительных людей, имеют ДНК ВГВ в печени, которая может
205 начать репликацию при тяжелой иммуносупрессии. [15]

206 Как видно из таблицы 2, гуморальный уровень иммунитета против ВГВ
207 не повлиял на количество положительных тестов anti-НВс. Отмечается даже
208 некоторый парадокс: удельный вес anti-НВс в группе с протективным уровнем
209 anti-НВс почти в 2 раза выше, чем в группе с отсутствием защитных титров
210 anti-НВс (46,6% и 23,8% соответственно). Это подтверждает наше мнение о
211 том, что вакцинация в ряде случаев проводилась уже инфицированным
212 вирусом ГВ медицинским работникам без наличия у них клинических
213 проявлений заболевания.

214 Анализ данных таблицы 3 показал отсутствие протективных уровней
215 иммунитета (anti-НВс <10 мМЕ/мл) у медицинских работников, привитых в
216 разные сроки. При этом наибольший удельный вес anti-НВс - 62,4% (116;
217 95%ДИ 56,35-70,42) отмечен в группе привитых от 6 до 15 лет назад,
218 наименьший удельный вес -5,4% (10; 95% ДИ: 3,01- 9,81) в группе привитых
219 до 5 лет назад, что косвенно свидетельствует о возможностях вакцинации
220 повлиять на процесс профилактики инфицирования вирусом в первые 5 лет
221 после вакцинации.

222 Из анализа данных привитых медицинских работников с наличием
223 протективных уровней anti-НВс (>10 мМЕ/мл) по годам, прошедшим от
224 первичной вакцинации, можно отметить, что у 23,7% был выявлен anti-НВс
225 так же, как и среди группы лиц с отсутствием гуморального иммунитета
226 (23,8%). При этом наименьшая доля anti-НВс -3,4% (13; 95%ДИ :2,03- 5,82)
227 регистрируется среди медицинских работников, у которых вакцинация
228 против ВГВ была проведена в течение 5 лет.

229 Спорный вопрос, с чем связано наличие anti-НВс в проективном титре
230 >10 мМЕ/мл у 16 (34,8%) (16; 95%ДИ: 24,49 - 53,16) лиц, невакцинированных

231 против ВГВ. Средний возраст этих лиц составил 47 лет, т. е. они не могли быть
232 привиты ранее. Высокий процент среди них anti-HBс+ (87,5%)(13; 95% ДИ:
233 77,1- 100,0) свидетельствует о том, что они переболели ВГВ в прошлом и
234 приобрели постинфекционные антитела к ВГВ, что, впрочем, не уберегло их
235 от возможной латентной формы ГВ. Эти лица нуждаются в углубленном
236 обследовании для исключения ЛГВ.

237 В зарубежной литературе имеются сведения об аналогичных
238 исследованиях [16, 18, 19]. Вместе с тем, в нескольких матанализах мы не
239 нашли сведений о комплексных исследованиях, посвященных распределению
240 anti-HBс в зависимости от пола, возраста, состояния напряженности
241 иммунитета к ВГВ. В исследованиях Mabunda N, Vieira L, Mueller A, Stoetter
242 L, Kitamura K, Fukano K и др., на основании выявленных маркеров к ВГВ, в
243 том числе anti-HBс, анализировались в основном знания медицинских
244 работников о вакцинации и сведения по обучению и убеждению работников
245 медицинских организаций в необходимости иммунизации.

246 Заключение: 1. Сравнительный анализ когорты вакцинированных
247 против ВГВ медицинских работников, и когорты непривитых по наличию
248 анти-HBс в крови показал, что 76,1% непривитых (35; 95%ДИ: 67,01- 92,95) и
249 23,8% привитых (566; 95%ДИ: 33,21- 37,91) перенесли гепатит В в стертой
250 безжелтушной форме (поскольку никто не обращался за медицинской
251 помощью).

252 2. Иммунизация снизила вероятность заболевания ВГВ, в том числе ЛГВ
253 среди вакцинированных – в 2,1 раза несмотря на то, что 49%
254 вакцинированных против ВГВ медицинских работников не имели
255 протективного уровня гуморального иммунитета (anti-HBs <10 мМЕ/мл).

256 3. Установлена статистически достоверная корреляция между уровнем
257 иммунитета у привитых и обнаружением anti-HBс, который у
258 вакцинированных выявлялся в 2,7 раза реже по сравнению с непривитыми
259 ((p<0,001), что свидетельствует о том, что вакцинированные более защищены

260 не только от острой манифестированной формы ВГВ, но и от стертой
261 (безжелтушной) формы и, в ряде случаев, от ЛГВ.

262 4. Не выявлено взаимосвязи между частотой обнаружения маркера anti-
263 HBс и уровнями anti-HBs, что подтверждает гипотезу о проведенной
264 вакцинации на фоне уже инфицированных вирусом гепатита В медицинских
265 работников.

266 5. Прослеживаются взаимосвязи между самой низкой частотой
267 выявления маркера anti-HBс у медицинских работников и ближайших сроков
268 (3 мес. – 5 лет) после вакцинации против ВГВ. При этом как при отсутствии
269 защитных значений anti-HBs к ВГВ, так и при наличии протективных уровней
270 anti-HBs, регистрируется наименьшее число (5,4% и 3,4%) лиц с anti-HBс, что
271 косвенно свидетельствует о роли вакцинации в профилактике инфицирования
272 вирусом в ближайшие 5 лет после вакцинации.

273 6. Медицинские работники в когортах привитых и непривитых, являющиеся
274 серопозитивными по anti-HBс нуждаются в дальнейшем углубленном
275 обследовании с целью постановки диагноза и получения превентивного
276 лечения в случае подтверждения диагноза: хронический вирусный гепатит В
277 или ЛГВ.

278 5 Выводы

279 В алгоритм эпиднадзора за парентеральными вирусными гепатитами среди
280 работников медицинских организаций можно рекомендовать введение
281 комплексного серологического мониторинга, предусматривающего наряду с
282 определением HBsAg к ВГВ, маркеры anti-HBс, с созданием регистра групп
283 риска для дальнейшего динамического наблюдения и углубленного
284 клинического исследования при обнаружении anti-HBс с целью выявления
285 возможных источников инфекции, наиболее полной регистрации в первую
286 очередь хронических форм ВГВ, уточнения диагноза и оказания адекватной
287 медицинской помощи лицам с хроническим гепатитом В, в том числе

- 288 латентным гепатитом В для профилактики гепатокарциномы и цирроза
289 печени в будущем.

ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Сравнительные данные по обнаружению anti-HBс в крови вакцинированных против ВГВ и непривитых медицинских работников.

Table 1. Comparative data on the detection of anti-HBс in the blood of HBV vaccinated and unvaccinated medical workers.

	Вакцинированные Vaccinated		Непривитые Unvaccinated	
Абс. Числа Abs. numbers	1597		46	
Группы Groups	anti-HBс + (1)	anti-HBс – (2)	anti-HBс + (3)	anti-HBс – (4)
Абс. Числа Abs. numbers	566	1031	35	11
% (95%ДИ) (95%CI)	35,4 (33,21; 37,91)	64,6 (62,33; 67,03)	76,1 (67,01; 92,95)	23,9 (15,02; 40,96)
p	$p_{1-2} < 0,001$, ($\chi^2=270,8$, $df=1$, $RR=1,82$ (95%ДИ 1,69-1,96); $p_{2-4} < 0,001$, ($\chi^2=31,84$, $df=1$, $RR=1,05$ (95%ДИ 1,03-1,07); $p_{3-4} < 0,001$, ($\chi^2=25,04$, $df=1$, $RR=3,18$ (95%ДИ 1,85-5,46), $p_{1-3} < 0,001$, ($\chi^2=1,84$, $df=1$, $RR=0,95$ (95%ДИ 0,93-0,97)			

Таблица 2. Распределение anti-HBс у вакцинированных против ВГВ медицинских работников с наличием и отсутствием протективного уровня anti-HBs.

Table 2. Distribution anti-HBс in HBV vaccinated healthcare workers with and without protective levels of anti-HBs.

	Число вакцинированных лиц с anti-HBs <10 мМЕ/мл The number of vaccinated people with anti-HBs <10 mIU/m		Число вакцинированных лиц с anti-HBs >10 мМЕ/мл The number of vaccinated people with anti-HBs >10 mIU/m	
Абс. Числа Abs. numbers	781		815	
Группы Groups	anti-HBс + (1)	anti-HBс - (2)	anti-HBс + (3)	anti-HBс - (4)
Абс. Числа Abs. numbers	186	595	380	435
% (95%ДИ) (95%CI)	23,8 (21,06; 27,06)	76,2 (73,43; 79,43)	46,6 (43,43; 50,29)	53,4 (50,18; 57,04)
р	<p>$p_{1-2} < 0,001$ ($\chi^2=428,4$, $df=1$, $RR=3,20$ (95%ДИ 2,89-3,65); $p_{1-3} < 0,001$ ($\chi^2=90,67$, $df=1$, $RR=0,57$ (95%ДИ 0,50-0,65); $p_{2-4} < 0,001$ ($\chi^2=90,67$, $df=1$, $RR=1,76$ (95%ДИ 1,55-2,00); $p_{3-4} = 0,004$ ($\chi^2=7,42$, $df=1$, $RR=1,14$ (95%ДИ 1,04-1,36)</p>			

Таблица 3. Распределение привитых против ВГВ медицинских работников с отсутствием протективных уровней anti-HBs (<10 мМЕ/мл) и наличием anti-HBc по годам, прошедшим от первичной вакцинации.

Table 3. Distribution of medical workers vaccinated against HBV with the absence of protective levels of anti-HBs (<10 mIU/ml) and the presence of anti-HBc by years after primary vaccination.

Время от первичной вакцинации Time from primary vaccination	3 мес.– 5 лет 3 months– 5 years	6-15 лет 6-15 years old	16-23 года 16-23 years old	Всего Total
Группы Groups	(1)	(2)	(3)	
Абс.числа лиц с anti-HBs <10 мМЕ/мл Abs.number of people with anti-HBs <10 mIU/ml	31	455	295	781
Абс.числа лиц с anti-HBc + (n-186) Abs.number of persons with anti-HBc + (n-186)	10	116	60	186
% (95% ДИ) (95% CI)	5,4 (3,01; 9,81)	62,4 (56,35; 70,42)	32,2 (26,49; 40,08)	100

p	<p>$p_{1-2} < 0,001$ ($\chi^2 = 134,85$, $df = 1$, $RR = 0,11$ (95%ДИ 0,06-0,20);</p> <p>$p_{2-3} < 0,001$ ($\chi^2 = 33,8$, $df = 1$, $RR = 1,85$ (95%ДИ 1,49-2,29);</p> <p>$p_{1-3} < 0,001$ ($\chi^2 = 43,99$, $df = 1$, $RR = 0,25$ (95%ДИ 0,14-0,44);</p>
---	---

Таблица 4. Распределение привитых против ВГВ медицинских работников с наличием протективных уровней anti-HBs (>10 мМЕ/мл) и наличием anti-HBc по годам, прошедшим от первичной вакцинации.

Table 4. Distribution of HBV vaccinated healthcare workers with protective levels of anti-HBs (>10 mIU/ml) and anti-HBc by years after primary vaccination.

Время от первичной вакцинации Time from primary vaccination	3 мес. –5 лет 3 months–5 years	6-15 лет 6-15 years old	16–23 года 16-23 years old	Всего Total
Группы Groups	(1)	(2)	(3)	
Абс. числа лиц с anti-HBs >10 мМЕ/мл Abs.number of people with anti-HBs >10 mIU/ml	43	470	302	815
Абс.числа лиц с anti-HBc + (n =380) Abs.number of persons with anti-HC + (n-380)	13	239	128	380
% (95%ДИ) (95%CI)	3,4 (2,03; 5,82)	62,9 (58,51; 68,28)	33,7 (29,41; 38,97)	100
p	p ₁₋₂ <0,001 ($\chi^2=303,2$, df=1, RR=0,07 (95%ДИ 0,04-0,12);			

	<p>$p_{2-3} < 0,001$ ($\chi^2=64,92$, $df=1$, $RR=1,82$ (95%ДИ 1,56-2,11);</p> <p>$p_{1-3} < 0,001$ ($\chi^2=115,16$, $df=1$, $RR=0,15$ (95%ДИ 0,09-0,26)</p>
--	---

Таблица 5. Распределение anti-HBс у непривитых против ВГВ медицинских работников.

Table 5. Distribution of anti-HBс in unvaccinated medical workers.

	Число непривитых лиц с anti-HBс <10 мМЕ/мл Number of unvaccinated people with anti-HBс <10 mIU/ml		Число лиц с anti-HBс >10 мМЕ/мл Number of people with anti-HBс >10 mIU/ml	
Абс. Числа /% (95%ДИ) Abs. Numbers /% (95%CI)	30/ 65,2% (54,82; 83,49)		16/34,8% (24,49; 53,16)	
Группы Groups	anti-HBс + (1)	anti-HBс - (2)	anti-HBс + (3)	anti-HBс - (4)
Абс. числа Abs. Numbers	21	9	14	2
% (95%ДИ) (95%CI)	70 (58,32; 93,24)	30 (18,65; 53,57)	87,5 (77,1; 100,0)	12,5 (4,22; 43,42)
p	<p>$p_{1-2}=0,001$ ($\chi^2=9,6$, $df=1$, $RR=0,42$ (95%ДИ 0,24-0,78); $p_{2-4}=0,125$ ($\chi^2=1,76$, $df=1$, $RR=1,36$ (95%ДИ 0,92-2,01); $p_{3-4}<0,001$ ($\chi^2=18,0$, $df=1$, $RR=0,14$ (95%ДИ 0,04-0,53); $p_{1-3}=0,125$ ($\chi^2=1,76$ $df=1$, $RR=0,73$ (95%ДИ 0,50-1,08)</p>			

РИСУНКИ

Рисунок 1. Удельный вес (%) anti-HBc в когорте медицинских работников.

Figure 1. Proportion (%) of anti-HBc in the cohort of medical workers.

Рисунок 2. Удельный вес (%) anti-HBc в когорте медицинских работников, вакцинированных против ВГВ.

Figure 2. Proportion (%) of anti-HBc in the cohort of medical workers, vaccinated against HBV.

Рисунок 3. Удельный вес (%) anti-HBс в когорте медицинских работников, непривитых против ВГВ.

Figure 3. Proportion (%) of anti-HCV in the cohort of medical workers unvaccinated against HBV.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ_МЕТАДААННЫЕ

Блок 1. Информация об авторе ответственном за переписку

Храпунова Изабелла Абрамовна, д.м.н. профессор кафедры эпидемиологии и современных технологий вакцинации Института профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Сеченовский университет), ведущий научный сотрудник лаборатории профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи Федерального бюджетного учреждения науки Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора;

адрес: 117564, Москва, ул. Вильнюсская,13, кв. 136;

телефон: 8(903)711-08-55;

ORCID 0000-0001-9327-4163;

e-mail: izabella-khrapunva@rambler.ru

Khrapunova Isabella Abramovna, Doctor of Medicine, Professor of the Department of Epidemiology and Modern Vaccination Technologies of the Institute of Professional Education of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Leading Researcher of the Laboratory for the Prevention of Infections Associated with the Provision of Medical Care of the Central Research Institute of Epidemiology of Rospotrebnadzor;

address: 117564 Moscow, 13 Vilisskaya St., sq. 136;

telephone: 8(903)711-08-55;

ORCID 0000-0001-9327-4163;

e-mail: izabella-khrapunva@rambler.ru

Блок 2. Информация об авторах

Костинов М. П., д.м.н., профессор, член-корр. РАН, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»; заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Института профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Сеченовский университет);

ORCID 0000-0002-1382-9403;

e-mail: monolit.96@mail.ru

Kostinov Mikhail Petrovich, Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor of Medicine, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Head of the Laboratory of Vaccine Prophylaxis and Immunotherapy of Allergic Diseases of the I.I. Mechnikov Research Institute of Vaccines and Serums; Head of the Department of Epidemiology and Modern Vaccination Technologies of the Professional Education Institute of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University);

ORCID 0000-0002-1382-9403;

e-mail: monolit.96@mail.ru

Магомедова Наида Абдулхаликовна, ассистент кафедры социальной гигиены, организации надзора с курсом лабораторной диагностики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Дагестанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации, аспирант кафедры эпидемиологии и современных технологий вакцинации Института профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Сеченовский университет);

ORCID 0009-0001-7110-7951;

e-mail: khirasulova@mail.ru

Magomedova Naida Abdulkhalikovna, Assistant of the Department of Social Hygiene, Organization of Surveillance, with a Course of Laboratory Diagnostics, Dagestan State Medical University, Ministry of Health of Russia, Makhachkala; postgraduate student of the Department of Epidemiology and Modern Vaccination Technologies of the Institute of Professional Education of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University);

ORCID 0009-0001-7110-7951;

e-mail: khirasulova@mail.ru

Храпунова Изабелла Абрамовна, д.м.н. профессор кафедры эпидемиологии и современных технологий вакцинации Института профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Сеченовский университет), ведущий научный сотрудник лаборатории профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи Федерального бюджетного учреждения науки Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора;

ORCID 0000-0001-9327-4163;

e-mail: izabella-khrapunva@rambler.ru

Khrapunova Isabella Abramovna, Doctor of Medicine, Professor of the Department of Epidemiology and Modern Vaccination Technologies of the Institute of Professional Education of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Leading Researcher of the Laboratory for the Prevention of Infections Associated with the Provision of Medical Care of the Central Research Institute of Epidemiology of Rospotrebnadzor;

ORCID 0000-0001-9327-4163;

e-mail: izabella-khrapunva@rambler.ru

Линок А. В., к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии и современных технологий вакцинации Института профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Сеченовский университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации; научный сотрудник лаборатории эпидемиологического анализа и мониторинга инфекционных заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»;

ORCID 0000-0002-5980-8560;

e-mail: linok_a_v@staff.sechenov.ru

Linok Andrey Viktorovich, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Epidemiology and Modern Vaccination Technologies of the Institute of Professional Education of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) of the Ministry of Health of the Russian Federation; research associate of the Laboratory for Epidemiological Analysis and Monitoring of Infectious Diseases of the I.I. Mechnikov Research Institute of Vaccines and Serums;

ORCID 0000-0002-5980-8560;

e-mail: linok_a_v@staff.sechenov.ru

Локтионова М. Н., к.м.н., доцент кафедры эпидемиологии и современных технологий вакцинации Института профессионального образования ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» (Сеченовский университет) Министерства здравоохранения Российской Федерации; старший научный сотрудник лаборатории эпидемиологии природно-очаговых инфекций Федерального бюджетного учреждения науки Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора;

ORCID 0000-0003-1332-519X;

e-mail: m.lokt@mail.ru

Loktionova Marina Nikolaevna, PhD in Medical Science, Associate Professor, Department of Epidemiology and Modern Vaccination Technologies of the Professional Education Institute of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Senior Researcher at the Laboratory of Epidemiology of Natural Focal Infections of the Central Research Institute of Epidemiology of Rospotrebnadzor;
ORCID 0000-0003-1332-519X;
e-mail: m.lokt@mail.ru

Полищук Валентина Борисовна, к.м.н., ведущий научный сотрудник лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»;

ORCID: 0000-0003-0533-0909;

e-mail: polischook@mail.ru

Polishchuk Valentina Borisovna, Cand. Sci. (Med.), Senior Researcher of the Laboratory of Vaccine Prophylaxis and Immunotherapy of Allergic Diseases of the I.I. Mechnikov Research Institute of Vaccines and Serums;

ORCID: 0000-0003-0533-0909;

e-mail: polischook@mail.ru

Ястребова Наталия Евгеньевна, д.м.н., профессор, заведующая лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова»;

ORCID: 0000 - 0002-6911-1345;

e-mail: yastreb03@rambler.ru

Yastrebova Natalia Evgenievna, Doctor of Medicine, Professor, Head of the Laboratory of Immunochemical Diagnostics of the I.I. Mechnikov Research Institute of Vaccines and Serums;

ORCID: 0000 - 0002-6911-1345;

e-mail: yastreb03@rambler.ru

Поддубиков Арсений Александрович, студент, 3 курс Институт клинической медицины им. Н.В. Склифосовского Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет);

ORCID: 0009-0003-7494-3554;

e-mail: arseniypoddibikov@gmail.com

Poddubikov Arseniy Alexandrovich, 3rd year student at the N.V. Sklifosovsky Institute of Clinical Medicine of the I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University);

ORCID: 0009-0003-7494-3554;

e-mail: arseniypoddibikov@gmail.com

Блок 3. Метаданные статьи

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ANTI-HBC В ГРУППАХ НЕПРИВИТЫХ И
ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, БЕЗ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ НА МАРКЕРЫ ВГВ,
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

THE INCIDENCE OF ANTI-HBC ANTIBODIES IN GROUPS OF MEDICAL
WORKERS WHO WERE EITHER UNVACCINATED OR VACCINATED
AGAINST HEPATITIS B WITHOUT PRIOR TESTING FOR HBV MARKERS

Сокращенное название статьи для верхнего колонтитула:

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ANTI-HBC
FREQUENCY OF OCCURRENCE OF ANTI-HBC

Ключевые слова: Медицинские работники, вакцинация против гепатита В, поствакцинальные anti-HBs, анти-HBc, латентная форма гепатита В, поствакцинальный иммунитет.

Keywords: Medical workers, Hepatitis B vaccination, post-vaccination anti-HBs, Anti-HBc, latent form of hepatitis B, post-vaccination immunity.

Оригинальные статьи.

Количество страниц текста – 8,

количество таблиц – 5,

количество рисунков – 3.

29.01.2025

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Порядковый номер ссылки	Авторы, название публикации и источника, где она опубликована, выходные данные	ФИО, название публикации и источника на английском	Полный интернет-адрес (URL) цитируемой статьи и/или doi
1.	Бацких С. Н. Перенесенный гепатит В: разрешившаяся проблема или мнимое благополучие? // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. 2021. Т. 31, №1. С. 7-19.	Batskikh S.N. Resolved hepatitis b: achieved or imaginary wellbeing? Rus J Gastroenterol Hepatol Coloproctol, 2021, Vol. 31, no. 1, pp.7-19	doi: 10.22416/1382-4376-2021-31-1-7-19.
2.	Вакцинация против гепатита В, гриппа и краснухи взрослых пациентов с хроническими заболеваниями / Под ред. М. П. Костинова, В. В. Зверева. – М.: Группа МДВ, 2009. – 196 с.	Vaccination against hepatitis B, influenza and rubella in adult patients with chronic diseases. Edited by M. P. Kostinov, V. V. Zverev. Moscow: MDV Group, 2009. 196 p.	https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19546331

3.	Гржибовский А. М., Иванов С. В., Горбатова М. А. Анализ номинальных и ранговых переменных данных с использованием программного обеспечения Statistica и SPSS // Наука и здравоохранение. 2016. №6. URL: (дата обращения: 11.06.2025).	Grzhibovsky A.M., Ivanov S. V., Gorbatova M. A. Analysis of nominal and rank variable data using the software Statistica and SPSS / // Science and Healthcare. - 2016. – No. 6. – pp. 5-39.	https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-nominalnyh-i-rangovyh-peremennyh-dannyh-s-ispolzovaniem-programmnogo-obespecheniya-statistica-i-spss
4.	Гржибовский А.Н. Выбор статистического критерия для проверки гипотез // Экология человека. 2008. № 11. С. 48-57.	Grjibovski A.M. Choosing a statistical test for hypothesis testing. Ekologiya cheloveka (human ecology). 2008, Vol. 11, pp.48-57	https://cyberleninka.ru/article/n/vybor-statisticheskogo-kriteriya-dlya-proverki-gipotez/viewer
5.	Исаева О.В., Ильченко Л.Ю., Кожанова Т.В., Клушкина В.В., Сарыглар А.А., Аль-Шараби Шукри, Амон Е. П., Кюрегян К.К., Михайлов М.И. Влияние вакцинации против гепатита В на распространенность	Isaeva O.V., Ilchenko L.Yu., Kozhanova T.V., Klushkina V.V., Suryglar A.A., Al-Sharabi Sh.A.S., Amon E.P., Kuregyan K.K., Mikhaylov M.I. The impact of universal vaccination against hepatitis b on the prevalence of hepatitis d in endemic	doi: 10.24411/2305-3496-2019-12004.

	гепатита дельта в эндемичном регионе // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. 2019. Т. 8, № 2. С. 36-42.	region. Infectious diseases: news, views, education. 2019, Vol. 8, no. 2, pp. 36-42	
6.	Костинов М. П. Вакцинация взрослых – от стратегии к тактике. Руководство для врачей. – Москва: Группа МДВ, 2020. 248 с.	Kostinov M. P. Adult vaccination – from strategy to tactics. A guide for doctors. Moscow: MDV Group, 2020. 248 p.	https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=rfgmwz
7.	«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году» государственный доклад Роспотребнадзора // Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 2024.	"On the state of sanitary and epidemiological welfare of the population in the Russian Federation in 2023" the State report of Rospotrebnadzor . Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing. 2024.	https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=27779&ysclid=m5yjkrfapr808853649

8.	«Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» Приказ Минздрава России от 06.12.2021 N 1122н	"On approval of the national calendar of preventive vaccinations, the calendar of preventive vaccinations for epidemic indications and the procedure for preventive vaccinations" Order of the Ministry of Health of the Russian Federation dated 06.12.2021 N 1122n	https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=475217&ysclid=m5yjfa2c7450541785
9.	Туполева Т.А. Латентная форма инфекции, вызванная вирусом гепатита В // Гематология и трансфузиология. 2018. Т.:№63, №2. С. 166-173.	Tupoleva T.A. Occult form of infection caused by the hepatitis b virus. Russian journal of hematology and transfusiology, 2018, Vol. 2, pp. 166-173	doi:10.25837/HAT.2018.68..2..007
10.	Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная система) / Под	Federal Guidelines on the Use of Medicines (formulary system) . Edited by A. G. Chuchalin, V. V. Yasnetsov. – Vol. XVI. – M., 2015. – 1016 p.	https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25950598

	ред. А. Г. Чучалина, В. В. Яснецова. – Вып. XVI. – М., 2015. – 1016 с. Ссылка		
11.	Филатов Н.Н., Храпунова И.А., Филиппов В.Ю. Основные факторы профессионального заражения медицинских работников гемоконтактными инфекциями // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2005. № 2. С. 41-45.	Filatov N.N., Khrapunova I.A., Filippov V.A., The main factors of occupational infection of medical workers with hemocontact infections. Epidemiology and Vaccinal Prevention, 2005, Vol. 2, no. 21, pp. 41-45	https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-factory-professionalnogo-zarazheniya-meditsinskih-rabotnikov-gemokontaktnymi-infektsiyami
12.	Широнина Н. Л., Додонов Н. П., Широнина Н. Л., Польская Л. Р. Гепатит В у медицинских работников. Эпидемиологические особенности и методы профилактики // Мир вирусных гепатитов. 2002, № 10. С. 2-6.	Shironina N. L., Dodonov N. P., Shironina N. L., Polskaya L. R. Hepatitis B in medical workers. Epidemiological features and methods of prevention. The world of viral hepatitis. 2002, no. 10. pp. 2-6.	https://cyberleninka.ru/article/n/gepatit-v-u-meditsinskih-rabotnikov-epidemiologicheskie-osobennosti-i-metody-profilaktiki

13.	Якупова Ф.М., Гарипова Р.В., Гилмуллина Ф.С. Созинова Ю.М., Загидов М.М. Вирусные гепатиты В и С как профессиональные заболевания // Медицинский вестник Юга России. 2022. Т. 13, №4. С. 39-44.	Yakupova F.M., Garipova R.V., Gilmullina F.S., Sozinova J.M., Zagidov M.M. Viral hepatitis b and c as occupational diseases. Medical herald of the south of Russia, 2022, Vol. 13, no. 4, pp. 39-44.	doi: 10.21886/2219-8075-2022-13-4-39-44
14.	Busch M. P. Should HBV DNA NAT replace HBsAg and/or anti-HBc screening of blood donors?. Transfusion Clinique et Biologique. 2004, Vol. 11, no 1, pp. 26-32.	-	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14980546
15.	Gerlich V.H., Bremer S., Sanevsky M., Schüttler K.G., Wend U.K., Willems V.R., Glebe D. Latent hepatitis B virus infection: detection and significance. Dig Dis. 2010, vol. 28, no. 1, pp:116-125.		doi: 10.1159/000282074.

16.	Kitamura K., Fukano K., Qiu L., Li Y., Wakae K., Muramatsu M. Activities of endogenous APOBEC3s and uracil-DNA-glycosylase affect the hypermutation frequency of hepatitis B virus cccDNA. J Gen Virol. 2022 no. 103:4.		doi: 10.1099/jgv.0.001732
17.	Kotake T., H. Satake, Y. Okita Hatachi Y, Hamada M, Omiya M, Yasui H, Hashida T, Kaihara S, Inokuma T, Tsuji A. Prevalence and risk factors of hepatitis B virus reactivation in patients with solid tumors with resolved HBV infection. Asia-Pacific Journal of Clinical Oncology. 2019, Vol. 15.no 1, pp. 63-68.	-	doi: 10.1111/ajco.13050
18.	Mabunda N., Vieira L., Chelen I., Mauwaya S., Zikai A.F., Duaha A., Shale		doi:10.1371/journal.pone.0276283

	F., Shambal L., Wubil A., Augusto O. Prevalence of hepatitis B virus and immunity status among healthcare workers in Beira City, Mozambique. PLoS One. 2022, vol. 17, no. 10:e0276283.		
19.	Müller A., Stötter L., Kalluvya S., Stitch A., Majinge S., Weisbriech B., Kasang S. Prevalence of hepatitis B virus infection among health care workers in a tertiary hospital in Tanzania. BMC Infect Dis. 2015. No. 15:386.		Doi:10.1186/s12879-015-1129-z
20.	Raimondo G., Locarnini S., Pollicino T., Levrero M., Zoulim F., Lok A.S.. Update of the statements on biology and clinical impact of occult hepatitis B virus	-	doi:10.1016/j.jhep.2019.03.034

	infection. Journal of Hepatology. 2019, Vol. 71, no. 2. pp. 397-408.		
21.	Raimondo G., Pollichino T., Cacciola I., Squadrito G. Latent infection caused by hepatitis B virus. J Hepatol. January 2007, Vol. 46, no. 1, pp:160-70.		doi: 10.1016/j.jhep.2006.10.007.
22.	Terrault N. A., Lok A. S. F., McMahon B. J., Chang K.M., Hwang J.P., Jonas M.M., Brown R.S. Jr, Bzowej N.H., Wong J.B.. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance. Hepatology. 2018, vol. 67, no 4. pp. 1560-1599.	-	doi: 10.1002/hep.29800
23.	Wang Q., Klenerman P., Semmo N. Significance of anti-HBc alone serological status in clinical practice. The	-	doi: 10.1016/S2468-1253(16)30076-0

	Lancet Gastroenterology & Hepatology. 2017, vol. 2, no. 2, pp. 123-134.		
24.	World Health Organization. Guidelines for the prevention, care, and treatment of persons with chronic hepatitis B infection. Geneva. 2015.	-	https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26225396/